



Colonoscopia: cómo prepararse con SUPREP® en caso de estreñimiento

CAMBIOS EN LA MEDICACIÓN

Es posible que deba suspender o ajustar los anticoagulantes o los medicamentos para la diabetes antes del procedimiento. Llame a nuestro consultorio si no recibió las instrucciones.

// **Anticoagulantes:** por ejemplo, prasugrel (Effient®), warfarina (Coumadin®), clopidogrel (Plavix®), dabigatrán (Pradaxa®), rivaroxabán (Xarelto®), apixabán (Eliquis®), enoxaparina (Lovenox®) o ticagrelor (Brilinta®).

No debe suspender la aspirina a menos que se le haya indicado lo contrario.

// **Medicamentos para la diabetes:** es posible que los medicamentos para la diabetes y las mediciones de azúcar en sangre tengan que modificarse durante el tiempo de preparación. Llame a su profesional de atención primaria para que lo oriente.

7 DÍAS ANTES

Consiga un conductor autorizado.

Debe tener al menos 18 años y contar con un teléfono móvil.

5 DÍAS ANTES

COMIENCE una dieta baja en residuos.

ESCOJA estos tipos de alimentos:

- // Pan, pasta o arroz blanco.
- // Cereales bajos en fibra (arroz inflado, crema de trigo, copos de maíz).
- // Frutas y verduras enlatadas o cocinadas sin semillas ni cáscara.
- // Yogur (sin semillas ni bayas), queso cottage o huevos.
- // Carne blanda bien cocinada o carne picada sin cartílagos.
- // Galletas saladas, galletas dulces o tortas.

EVITE estos tipos de alimentos:

- // Maíz, palomitas de maíz, semillas y frutos secos.
- // Verduras crudas, frijoles, lentejas y cáscara de papa.
- // Frutas con cáscara o semillas.
- // Panes integrales, granola y cereales con alto contenido en fibra.

Para obtener más información sobre dietas bajas en residuos, visite:

www.iowaclinic.com/gastroenterology/specialties/endoscopy-center/patient-information

3 DÍAS ANTES

BUSQUE LA PREPARACIÓN PARA EL INTESTINO en la farmacia:

- // Receta de SUPREP®.
- // Un frasco de citrato de magnesio líquido (producto de venta libre).

Suspenda estos medicamentos:

- // Suplementos de fibra o hierro (como Metamucil®, Citrucel® o Benefiber®).
- // Medicamentos antidiarreicos (como Kaopectate®, Lomotil®, Pepto-Bismol®, Imodium® o loperamida).

2 DÍAS ANTES

COMIENZE una dieta de líquidos claros:

ESCOJA estos tipos de líquidos:

- // Agua y soda
- // Té o café sin leche ni crema
- // Caldo claro (de carne, pollo o verduras)
- // Jugos o bebidas deportivas claras
- // Paletas sin frutas ni crema
- // Gelatina sin frutas

EVITE estos tipos de alimentos:

- // Líquidos rojos y violetas
- // Leche y crema
- // Bebidas alcohólicas
- // Jugo de naranja, pomelo y tomate
- // Otras sopas que no sean caldo claro

06:00 p. m. (Dos noches ANTES del procedimiento):

- // Beba el frasco de citrato de magnesio.
-

1 DÍA ANTES

CONTINÚE con la dieta de líquidos claros.

06:00 p. m. (Tarde ANTERIOR al procedimiento):

- // Vierta **UN** (1) frasco de 6 onzas de SUPREP® líquido en el recipiente para la mezcla, agregue agua potable fría hasta la línea del recipiente que señala 16 onzas y mezcle.
 - // Beba **TODO** el líquido del recipiente.
 - // **DEBE** beber **DOS** (2) recipientes de 16 onzas de agua durante la siguiente hora. Usar un popote puede ayudar.
 - // Tendrá diarrea 1 o 2 horas después de beber la solución.
 - // Puede seguir bebiendo líquidos claros.
 - // Puede tomar sus medicamentos con un sorbo de agua (excepto aquellas que se le dijo que suspenda). Tome sus medicamentos al menos una hora antes o después de beber la preparación.
-

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

NO coma alimentos sólidos. Continúe tomando líquidos claros durante todo el día.

TOME la medicación para el corazón o la presión arterial la mañana del examen.

3 HORAS ANTES de su horario de ingreso

- // Vierta **UN** (1) frasco de 6 onzas de SUPREP® líquido en el recipiente para la mezcla, agregue agua potable fría hasta la línea del recipiente que señala 16 onzas y mezcle.
- // Beba **TODO** el líquido del recipiente.
- // **DEBE** beber **DOS** (2) recipientes de 16 onzas de agua durante la siguiente hora.
- // Sus heces deben ser claras/amarillas y acuosas. Las motas de heces son normales. Si sigue haciendo heces sólidas o marrones, llámenos al 515.875.9115

2 HORAS ANTES de su horario de ingreso

- // **DEBE** haber terminado de beber todos los líquidos.

LOS LÍQUIDOS CLAROS ESTÁN PERMITIDOS HASTA DOS HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO. EVITE LOS LÍQUIDOS ROJOS Y VIOLETAS.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- // Los beneficios de cobertura individual varían. Usted debe encargarse de consultar con su compañía aseguradora acerca de sus beneficios y cualquier tipo de autorización previa necesaria.
- // Su prueba se reprogramará si no cuenta con un conductor de 18 años o más disponible al momento de su llegada.

LO QUE DEBE HACER/TRAER EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

- // Tarjetas del seguro/Identificación con foto/Voluntades anticipadas (si las hay)
- // Lista de medicamentos/cirugías
- // Inhaladores o CPAP/BiPAP
- // Use ropa cómoda/no use sostén con aro
- // No traiga elementos de valor, como joyas

LO QUE DEBE ESPERAR

- // La duración aproximada de la estadía es de 2 a 3 horas. El conductor debe retirarse luego de dejarlo y se le indicará cuándo debe volver. Recuérdelo traer un teléfono móvil.
- // Tenga en cuenta que está prohibido consumir marihuana el día del procedimiento y que, si lo hace, el procedimiento será reprogramado.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?

Sus preguntas nos importan. Visite nuestro sitio web para obtener más información:
www.iowaclinic.com/prep-instructions.

También puede enviarnos un mensaje a través del portal MyHealth o llamarnos al 515.875.9115 si tiene preguntas o inquietudes.